

# *Partamona helleri* (Friese)

boca-de-sapo, cupira



**Hábito de nidificação:** Ocos em árvores, cavidades em paredes, sob raízes de epífitas e beiras de casas, ou ninhos expostos apoiados sobre galhos

**Ninho:** Favos de cria horizontais sobrepostos, com células reais, envoltos por invólucro. Um pequeno orifício comunica a região de crias e potes a uma larga câmara (vestíbulo) que antecede a entrada do ninho. Esta é construída com barro e resinas escuras e sua superfície interna é lisa e clara. Em vista frontal, possui formato triangular com os cantos arredondados, que se afunila gradualmente para o interior

**Colônia:** Sem informações disponíveis

**Aspectos gerais:** A arquitetura típica da entrada, semelhante à boca de um sapo, permite que as forrageiras entrem no ninho em alta velocidade, "batam" a cabeça no teto e partam em direção à pequena entrada interna. Possivelmente, esse comportamento seja uma defesa contra predadores que ficam na entrada do ninho. O forrageamento é mais alto no início da manhã e no final da tarde

**Distância máxima de voo:** Desconhecida

**Tamanho aproximado:** 6 mm



© Cristiano Menezes



Fonte: Catálogo Moure, acessado em 27 de janeiro de 2022



© RPSP